

【疾患】★不安定狭心症

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

1回のみ

1回のみ

1回のみ

1回のみ

経年

更新情報があるとき

1回のみ

現在の状態

症状の出現 ()年()月()日()時

重症度

- ClassI 2ヶ月以内に発症。1日3回以上の発作が頻発するか、軽労作にても発作がおきる増悪型狭心症。
- ClassII 1ヶ月以内に1回以上の安静狭心症。ただし48時間以内に発作はない。
- ClassIII 48時間以内に1回以上の安静時発作あり。
- 不明
- 未入力

臨床状況

- ClassA 貧血、発熱、低血圧、頻脈などの心外因子により出現。
- ClassB ClassAに示すような心外因子のないもの。
- ClassC 心筋梗塞発症後2週間以内の不安定狭心症。
- 不明
- 未入力

治療前のCCS分類

- 症状なし
- CCS class I
- CCS class II
- CCS class III
- CCS class IV
- 不明
- 未入力

治療後のCCS分類

- 症状なし
- CCS class I
- CCS class II
- CCS class III
- CCS class IV
- 不明
- 未入力

発作時の心電図所見

- ST上昇
- ST低下
- 不明
- 未入力