

【疾患】★ネフローゼ症候群

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

<p>原疾患(診断基準)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 微小変化 <input type="radio"/> 巣状系球体硬化症 <input type="radio"/> メサンギウム増殖性腎炎 <input type="radio"/> 膜性増殖性腎炎 <input type="radio"/> 膜性腎炎 <input type="radio"/> IgA腎症 <input type="radio"/> 2次性 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 糖尿病性腎症 <input type="checkbox"/> 膠原病 <input type="checkbox"/> アミロイドーシス <input type="checkbox"/> 薬剤性 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="radio"/> その他 	<p>経年</p>
<p>腎生検診断</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 微小変化 <input type="radio"/> 巣状系球体硬化症 <input type="radio"/> メサンギウム増殖性腎炎 <input type="radio"/> 膜性増殖性腎炎 <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> stage1 <input type="radio"/> stage2 <input type="radio"/> stage3 <input type="radio"/> stage4 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 膜性腎炎 <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> grade1 <input type="radio"/> grade2 <input type="radio"/> grade3 <input type="radio"/> grade4 <input type="radio"/> grade5 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> IgA腎症 <input type="radio"/> 管内増殖性系球体腎炎 <input type="radio"/> 半月体形成性系球体腎炎 <input type="radio"/> その他 <input type="radio"/> 未入力 () 	
<p>治療反応性</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 難治性 (種々の治療をしても6ヶ月以上の治療期間に完全寛解ないし不完全寛解1型に至らないもの) <input type="checkbox"/> ステロイド抵抗例 (副腎皮質ステロイド療法開始後、4-8週以内に完全寛解ないし不完全寛解1型に達しない症例) <input type="checkbox"/> ステロイド依存例 (副腎皮質ステロイド減量中あるいは中止後2週間以内に再発を2回以上繰り返す症例) <input type="checkbox"/> 頻回再発例 (6ヶ月間に2回以上の再発を示す症例回再発例) 	
<p>初診時所見 浮腫</p>	<p><input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり <input type="radio"/> ふめい <input type="radio"/> 未入力</p>	<p>1回のみ</p>