

(注意) : 複数選択

: 単一選択

文字列入力()

数字入力[]

凡例 入力項目分類 (数字は入力の優先順位)

- 1. 毎回入力項目 : 2重括弧 (毎回入力をしていただく項目)
- 2. 変更のみ入力項目 : 1重括弧 (前回からのデータ変更及びデータ追加があれば入力していただく項目)
- 3. 1回のみ項目 : 括弧なし (1回のみ入力すればよい項目)

日付項目

「不明」にチェックする場合 : プロジェクト開始以前のため、カルテ等で遡れない場合のみにして下さい。
 年月のみ判明している場合 : 年月は判明している情報を、日は「不明」を入力して下さい。

追加 1回の入力でシートを追加して入力可能

前回の内容をコピー 前回調査の入力をコピーして入力可能

(疾患) COPD

疾患の定義

呼吸機能検査において1秒率(FEV1/FVC)<70%であり、他の気流閉塞をきたしうる疾患が除外されている。

または、すでに GOLD の診断に基づき COPD と診断され、薬物治療等が行われている。

日本呼吸器学会 COPD ガイドライン第3版作成委員会(編)COPD の定義 COPD (慢性閉塞性肺疾患) 診断と治療のためのガイドライン 第3版 2009

診断日 []年 []月 []日 不明

前回の内容をコピー

GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease)

実施 未実施 不明

COPD における気流閉塞の重症度分類 (気管支拡張薬投与後 FEV1 に基づく分類)

対象 : FEV1/FVC が 0.7 未満の患者当てはまるものにチェックして下さい

- GOLD1 軽度 FEV1%pred ≥ 80
- GOLD2 中等度 80 > FEV1%pred ≥ 50
- GOLD3 重度 50 > FEV1%pred ≥ 30
- GOLD4 最重度 30 > FEV1%pred

COPD アセスメントテスト (CAT)

実施 未実施 不明

※ 初回登録時は問診して下さい。追跡時はカルテに記載があれば点数を入力し、なければ不明にしてください。
 []点 ※ 0~40 を記載。全ての項目に回答が得られない場合は不明にしてください。

COPD アセスメントテスト (CAT) ①~⑧の合計点

- ① まったく咳がない 0 1 2 3 4 5 いつも咳が出ている
- ② まったく痰がつまった感じがしない 0 1 2 3 4 5 いつも痰がつまった感じがする
- ③ まったく息苦しくない 0 1 2 3 4 5 非常に息苦しい
- ④ 坂や階段を上がっても息切れがしない 0 1 2 3 4 5 坂や階段を上がると、非常に息切れがする
- ⑤ 家での普段の生活が制限されることはない 0 1 2 3 4 5 家での普段の生活が非常に制限される
- ⑥ 肺の状態が気にせず外出できる 0 1 2 3 4 5 肺の状態が気になって、外出できない
- ⑦ よく眠れる 0 1 2 3 4 5 肺の状態が気になって、よく眠れない
- ⑧ とても元気だ 0 1 2 3 4 5 まったく元気がない

息切れの重症度を評価するための修正 MRC (British Medical Research Council) 質問表

実施 未実施 不明

※ 初回登録時は問診して下さい。追跡時はカルテに記載があれば入力し、なければ不明にしてください。

- 修正 MRC グレード 0 激しい運動をしたときだけ息切れがある
- 修正 MRC グレード 1 平坦な道を早足で歩いたり、穏やかな上り坂を歩いたりする時に息切れがある
- 修正 MRC グレード 2 息切れがあるので、同年代の人よりも平坦な道を歩くのが遅い、あるいは平坦な道を自分のペースで歩いている時、息切れのために立ち止まることがある
- 修正 MRC グレード 3 平坦な道を 100 メートルあるいは数分歩くと息切れのために立ち止まる
- 修正 MRC グレード 4 息切れがひどく家から出られない、あるいは衣服の着替えをする時にも息切れがある

症状 喘息 あり なし 不明

喘息発作(調査実施日時点) あり なし

COPD 急性増悪 あり なし 不明

ありの場合、最近の 1 年間 なし 年に 1 回あり 年に 2 回以上あり