

(注意) : 複数選択: 単一選択

文字列入力()

数字入力[]

凡例 入力項目分類 (数字は入力の優先順位)

1. 毎回入力項目 : 2重括弧 (毎回入力をしていただく項目)
2. 変更のみ入力項目 : 1重括弧 (前回からのデータ変更及びデータ追加があれば入力していただく項目)
3. 1回のみ項目 : 括弧なし (1回のみ入力すればよい項目)

日付項目

「不明」にチェックする場合 : プロジェクト開始以前のため、カルテ等で避れない場合のみにして下さい。
 年月のみ判明している場合 : 年月は判明している情報を、日は「不明」を入力して下さい。

追加

1回の入力でシートを追加して入力可能

前回の内容をコピー

前回調査の入力をコピーして入力可能

(疾患) 骨粗鬆症

疾患の定義

脆弱性骨折を有する、あるいは骨密度が YAM (若年成人平均値) の 70% 以下または $-2.5SD$ 以下である。

または、すでに骨粗鬆症と診断され、薬物治療等が行われている。

診断日 []年 []月 []日 不明

診断時の状態

骨塩量値

- YAM の 80% 以上
 YAM の 70-80%
 YAM の 70% 未満
 不明

脊椎 X 線像での骨粗鬆症化

- 疑いあり あり なし 不明

前回の内容をコピー

転倒履歴

「この 1 年間で、転んだり、階段などで落ちたりしたことがありますか？」

- あり なし 不明

[]回

疼痛

- あり なし 不明

 上背部痛

開始時期

 数日以内 1 月前から それ以上前から 腰痛

開始時期

 数日以内 1 月前から それ以上前から 大腿部痛

開始時期

 数日以内 1 月前から それ以上前から 他部位

開始時期

 数日以内 1 月前から それ以上前から

婦人科の既往

子宮摘出

 あり なし 不明

[]歳

 不明

卵巣摘出

 あり なし 不明

[]歳

 不明

乳腺疾患

 あり なし 不明

[]歳

 不明

(注意) : 複数選択: 単一選択

文字列入力()

数字入力[]

その他 あり なし 不明[]歳 不明

疾患名 ()

骨折の家族歴

脊椎圧迫骨折 あり なし 不明
 父 母 子供 兄弟 祖父母(父方) 祖父母(母方)
 孫 その他 不明
大腿骨頸部骨折 あり なし 不明
 父 母 子供 兄弟 祖父母(父方) 祖父母(母方)
 孫 その他 不明
前腕骨骨折 あり なし 不明
 父 母 子供 兄弟 祖父母(父方) 祖父母(母方)
 孫 その他 不明
上腕骨骨折 あり なし 不明
 父 母 子供 兄弟 祖父母(父方) 祖父母(母方)
 孫 その他 不明